

42H13 *Asparagus* L.-chřest

číslo	znak	stupnice	popis hodnoty znaku	hodnoty	poznámka	number	descriptor	scale	description	values	note
001	zbarvení vrcholu rašícího výhonu	1	bílé		hlavička rašícího výhonu musí být kompletně bílá	001	colour of spear top	1	white		the head of spear has to be completely white
001	zbarvení vrcholu rašícího výhonu	2	fialové		hlavička rašícího výhonu musí být růžová až fialová nebo purpurová a část prýtu musí být bílá	001	colour of spear top	2	purple		the head of spear has to be pink, lilac or purple and bottom has to be white
001	zbarvení vrcholu rašícího výhonu	3	fialovozelené		hlavička rašícího výhonu fialově až zeleně zbarvená	001	colour of spear top	3	Purple-green		the upper half of spear has to be purple or green and bottom part white
001	zbarvení vrcholu rašícího výhonu	4	zelené		hlavička rašícího výhonu musí být kompletně zelená	001	colour of spear top	4	green		the spear has to be completely green
002	počet výhonů na rostlině	3	malý	5-10	počítá se na konci vegetace	002	number of stalks on the plant	3	small	5-10	to be counted at the end of year
002	počet výhonů na rostlině	5	střední	11-15		002	number of stalks on the plant	5	medium	11-15	
002	počet výhonů na rostlině	7	vysoký	>16		002	number of stalks on the plant	7	high	>16	
003	výška výhonu na konci vegetace	3	nízká	<1,3 (m)	počítá se na konci vegetace	003	length of stalks at the vegetation end	3	short	<1.3 (m)	to be counted at the end of year
003	výška výhonu na konci vegetace	5	střední	1,31-1,7 (m)		003	length of stalks at the vegetation end	5	medium	1.31-1.7 (m)	
003	výška výhonu na konci vegetace	7	vysoká	>1,71 (m)		003	length of stalks at the vegetation end	7	long	>1.71 (m)	
004	průměrná délka fylokládií	3	krátké	<10 (mm)	fylokladia se měří ze střední části výhonu a to na konci vegetace	004	average phylloclade length	3	short	<10 (mm)	to be measured from the middle part of a stalk at the end of vegetation period at the end of year
004	průměrná délka fylokládií	5	střední	10-20 (mm)		004	average phylloclade length	5	medium	10-20 (mm)	
004	průměrná délka fylokládií	7	dlouhé	>21 (mm)		004	average phylloclade length	7	long	>21 (mm)	
005	průměrný počet fylokládií	3	malý	<5	provádí se současně s měřením délky fylokládií	005	average number of phylloclade	3	small	<5	to be counted together with phylloclades length measurement
005	průměrný počet fylokládií	5	střední	6-10		005	average number of phylloclade	5	medium	6-10	
005	průměrný počet fylokládií	7	vysoký	>11		005	average number of phylloclade	7	high	>11	
006	procento plodů vytvořených volným opylením	0	žádné	0 %	měřeno na jednom výhonu; počet msamičích květů na výhonu = 100 %	006	percentage of fruits setting by open pollination	0	absent	0 %	to be measured on one stalk of a female plant (number of flowers = 100 %)


číslo	znak	stupnice	popis hodnoty znaku	hodnoty	poznámka	number	descriptor	scale	description	values	note
006	procento plodů vytvořených volným opylením	3	nízké	1-5 %		006	percentage of fruits setting by open pollination	3	low	1-5 %	
006	procento plodů vytvořených volným opylením	5	střední	16-40%		006	percentage of fruits setting by open pollination	5	medium	16-40%	
006	procento plodů vytvořených volným opylením	7	vysoké	41-70%		006	percentage of fruits setting by open pollination	7	high	41-70%	
007	obsah vitamínu C (kyseliny L-askorbové) ve výhonu	3	nízký	<150 (mg/kg)	čerstvé hmoty (FW)	007	vitamin C (L-ascorbic acide) content of spear	3	low	<150 (mg/kg)	fresh matter (FW)
007	obsah vitamínu C (kyseliny L-askorbové) ve výhonu	5	střední	151-450 (mg/kg)		007	vitamin C (L-ascorbic acide) content of spear	5	medium	151-450 (mg/kg)	
007	obsah vitamínu C (kyseliny L-askorbové) ve výhonu	7	vysoký	>450 (mg/kg)		007	vitamin C (L-ascorbic acide) content of spear	7	high	>450 (mg/kg)	
008	obsah dusičnanů ve výhonu	3	velmi nízký	<30 (mg/kg)	čerstvé hmoty (FW)	008	nitrate content in the spear	3	very low	<30 (mg/kg)	fresh matter (FW)
008	obsah dusičnanů ve výhonu	5	nízký	31-50 (mg/kg)		008	nitrate content in the spear	5	low	31-50 (mg/kg)	
008	obsah dusičnanů ve výhonu	7	střední	>50 (mg/kg)		008	nitrate content in the spear	7	medium	>50 (mg/kg)	
009	začátek rašení	1	velmi raný	<-10 dní	počet dní v porovnání s kontrolní odrůdou 'Iva'	009	beginning of spear production	1	very early	<-10 days	number of days in relation to control variety 'Iva'
009	začátek rašení	3	raný	(-1)-(-10) dní		009	beginning of spear production	3	early	(-1)-(-10) days	
009	začátek rašení	5	střední	0 dní = kontrola		009	beginning of spear production	5	intermediate	0 days = control	
009	začátek rašení	7	pozdní	1-10 dní		009	beginning of spear production	7	late	1-10 days	
009	začátek rašení	9	velmi pozdní	>10 dní		009	beginning of spear production	9	very late	> 10 days	
010	začátek kvetení	3	raný	> (-7) dní	počet dní v porovnání s kontrolní odrůdou 'Iva'	010	beginning of flowering	3	early	> (-7) days	number of days in relation to control variety 'Iva'
010	začátek kvetení	5	střední	0 ± 7		010	beginning of flowering	5	intermediate	0 ± 7	
010	začátek kvetení	7	pozdní	> 7 dní		010	beginning of flowering	7	late	> 7 days	
011	konec kvetení	3	raný	> (-7) dní	počet dní v porovnání s kontrolní odrůdou 'Iva'	011	end of flowering	3	early	> (-7) days	number of days in relation to control variety 'Iva'
011	konec kvetení	5	střední	0 ± 7		011	end of flowering	5	intermediate	0 ± 7	
011	konec kvetení	7	pozdní	> 7 dní		011	end of flowering	7	late	> 7 days	
012	začátek zasychání nadzemní částí	3	raný	> (-7) dní	počet dní v porovnání s kontrolní odrůdou 'Iva' (10 % uschlých rostlin)	012	beginning of aerial part drying	3	early	> (-7) days	number of days in relation to control variety 'Iva' (10 % of dry plants)
012	začátek zasychání nadzemní částí	5	střední	0 ± 7		012	beginning of aerial part drying	5	intermediate	0 ± 7	
012	začátek zasychání nadzemní částí	7	pozdní	> 7 dní		012	beginning of aerial part drying	7	late	> 7 days	
013	citlivost vůči <i>Stemphylium botryosum</i>	3	nízká	>64	% přezimovaných rostlin; stanovuje se do 4. roku po výsadbě	013	susceptibility to <i>Stemphylium botryosum</i>	3	low	>64	Percentage (%) overwintered plants to be evaluated till 4 th year after planting

číslo	znak	stupnice	popis hodnoty znaku	hodnoty	poznámka	number	descriptor	scale	description	values	note
013	citlivost vůči <i>Stemphylium botryosum</i>	5	střední	65-84		013	susceptibility to <i>Stemphylium botryosum</i>	5	intermediate	65-84	
013	citlivost vůči <i>Stemphylium botryosum</i>	7	vysoká	85-100		013	susceptibility to <i>Stemphylium botryosum</i>	7	high	85-100	
014	citlivost vůči <i>Botrytis cinerea</i>	3	nízká	>64	% přezimovaných rostlin; stanovuje se do 4. roku po výsadbě	014	susceptibility to <i>Botrytis cinerea</i>	3	low	>64	Percentage (%) overwintered plants to be evaluated till 4 th year after planting
014	citlivost vůči <i>Botrytis cinerea</i>	5	střední	65-84		014	susceptibility to <i>Botrytis cinerea</i>	5	intermediate	65-84	
014	citlivost vůči <i>Botrytis cinerea</i>	7	vysoká	85-100		014	susceptibility to <i>Botrytis cinerea</i>	7	high	85-100	
015	citlivost vůči <i>Puccinia asparagi</i>	3	nízká	>64	% stonkových nekróz (SAN) na přezimovaných rostlinách; stanovuje se do 4. roku po výsadbě	015	susceptibility to <i>Puccinia asparagi</i>	3	low	>64	Percentage (%) of stem area necrosis (SAN) to be evaluated till 4 th year after planting
015	citlivost vůči <i>Puccinia asparagi</i>	5	střední	65-84		015	susceptibility to <i>Puccinia asparagi</i>	5	intermediate	65-84	
015	citlivost vůči <i>Puccinia asparagi</i>	7	vysoká	85-100		015	susceptibility to <i>Puccinia asparagi</i>	7	high	85-100	
016	citlivost vůči <i>Crioceris duodecimpunctata</i>	3	nízká	0-10	počet dospělců na jedné rostlině	016	susceptibility to <i>Crioceris duodecimpunctata</i>	3	low	0-10	evaluated number of imago on the one plant
016	citlivost vůči <i>Crioceris duodecimpunctata</i>	5	střední	11-30		016	susceptibility to <i>Crioceris duodecimpunctata</i>	5	intermediate	11-30	
016	citlivost vůči <i>Crioceris duodecimpunctata</i>	7	vysoká	> 30		016	susceptibility to <i>Crioceris duodecimpunctata</i>	7	high	> 30	



1 narrow triangular/
úzce trojúhelníkovitý 2 medium triangular/
středně trojúhelníkovitý 3 broad triangular/
široce trojúhelníkovitý

Fig.1/Obr.1 Spear: shape of apex/ Tvar vrcholu výhonu



1 smaller/menší 2 equal/stejný 3 larger/větší

Fig.2/Obr.2 Spear: diameter of base of apex compared to middle of stem / Průměr základu vrcholu výhonu k středu výhonu



1 adpressed /
přisedlé



2 slightly held out /
mírně odstávající



3 markedly held out /
vysoce odstávající

Fig.3/Obr.3 Attitude of bracts / Postavení braktejí